



PNEUMOKOKKIKANNAT MUUTTUVAT



9.5.2019 1

Uutiskirje 4/2019

Pneumokokin aiheuttamat vakavat taudit, kuten keuhkokuume ja verenmyrkytys, ovat vähentyneet merkittävästi rokottamisen avulla.

E erityisen merkittävää on tämän myötä tapahtunut antibioottien käytön lasku. Lisäksi pneumokokkirokotus vähentää korvien putkituksen tarvetta.

Rokotteen sisältämien pneumokokkikantojen vähentyessä ne korvautuvat toisilla kannoilla. Tämän vuoksi ennaltaehkäisy mahdollisimman tehokkaalla ja uusia kantoja sisältävällä rokotteella on tärkeää.

Pneumokokkirokotteen tutkimukseemme 2-3 kuukauden ikäisille vauvoille otetaan vielä mukaan uusia tutkittavia.

Tähän tutkimukseen osallistuvat lapset saavat tutkimusryhmästä riippuen joko 13 tai 15 eri bakteerityypiltä suojaavan laajatehoisemman pneumokokkirokotteen. Vanhemman halutessa lapsi saa myös iän mukaiset neuvolarokotteet tutkimuslinikalla.

Katso täältä uusi videomme, joka kertoo pneumokokkitaudeista sekä niiltä suojaavan, nykyistä laajatehoisemman rokotteen tarpeellisuudesta ja Suomessa tehtävästä tutkimustyöstä. Haastateltavana asiantuntijalääkäri Maria Hemming-Harlo.

Lue lääkäriksi opiskelevan Lotan kertomus pneumokokkirokotteen tutkimuksesta: Vauvan kanssa tutkimuksessa.

